



하절기 질식재해 발생위험 주의

매년 하절기(6~8월) 급격한 기온상승과 강우가 찾아지면서
오폐수 처리시설, 정화조 등 환기가 불충분하고 제한된 공간
에서 유기물의 부패로 인한 황화수소 중독 등 질식재해 발생
위험이 크게 증가하고 있습니다.



최근 하절기 질식재해 사례

- ▶ 18년 4월 OO축산농가에서 알코올 발효사료 제조 저장탱크 내부 청소작업 중 산소결핍으로 2명 사망
- ▶ 18년 5월 상수도 유지보수 공사를 위해 맨홀에 들어갔던 근로자가 산소결핍으로 2명 부상
- ▶ 18년 8월 절임무를 생산하는 OO식품 제조공장에서 탈염조에 들어갔던 근로자 1명이 황화수소 중독으로 사망하고 구조과정에서 1명 사망
- ▶ 17년 5월 OO양돈농장에서 집수조 내부청소를 위해 들어갔다가 황화수소 중독으로 2명 사망
- ▶ 16년 8월 OO공장 집수조 보수작업을 위해 내부로 들어갔던 근로자가 황화수소 중독으로 사망하고 구조과정에서 4명 부상
- ▶ 16년 8월 OO(주) 집수조 내부 배관수리작업 중 황화수소 중독으로 1명이 사망하고 구조과정에서 1명 사망, 1명 부상

질식재해예방을 위한 안전대책

- ① 작업 전 안전조치 및 종사 근로자 안전보건교육 실시
▲작업 위험요소 인지 ▲가스농도측정 및 환기방법
▲재해자 구조 및 응급처치 등
- ② 출입전 산소·유해가스 농도 측정
▲산소 18%이상 23.5%미만 ▲황화수소 10ppm미만
▲일산화탄소 30ppm미만 ▲탄산가스 1.5%미만
▲가연성가스 하한치(Lower flammable limit, LFL) 10%미만
- ③ 출입 전/출입 중 충분한 환기 실시
- ④ 감시인 배치, 작업자와 연락체계 구축, 출입인원 점검
▲밀폐공간 작업상황을 감시할 수 있는 감시인 배치
- ⑤ 위험한 근로자 구조시 송기마스크 또는 공기 호흡기 필히 착용

질식재해예방 Key message

반드시 필수 안전수칙을 지킵시다!

1	무단출입금지	'질식 위험장소는 사망할 수 있다'는 사항에 대해 인지 및 출입금지 조치 (사전조치 없이 절대 들어가지 못하게 함)
2	출입 전·출입 중 충분한 환기	죽은 공기는 강제 환기 없이는 잘 안 빠짐 반드시 환기팬으로 급기시켜야 함
3	구조 시 보호구 착용	환기팬 가동 불가능 상태이거나 구조 시에는 소방관처럼 반드시 공기호흡기 또는 송기마스크를 착용

※ 밀폐공간 작업 전, 환기장치 이상 시 산소·유해가스 농도 측정



질식사고 는 **나쁜사고*** 입니다.

*충분히 예측 가능하고 반드시 막아야 하는 사고